

TABLEAU D3

Médicaments neuropathiques à base de *DiffusiMAX*®

Médicament	Solvant	Composant <i>DiffusiMAX</i>	Gamme de concentration (%)	Concentration typique (%)	Fréquence d'application
clonidine	eau	B	0,1 – 0,2	0,1	bid – qid
capsicine	alcool	A	0,025 – 0,075	0,025	bid – qid
amitriptyline	alcool	A	1 – 4	2	bid – qid
gabapentin	propylène-glycol	B	4 – 8	4	tid – qid
phénytoïne	alcool	A	2 – 5	2	tid – qid
kétamine	alcool	A	0,5 – 2	1	tid – qid

Composant *DiffusiMAX* = composant du système *DiffusiMAX* à utiliser pour solubiliser le médicament.

Alcool = alcool éthylique (95 %) ou alcool isopropylique (70 %)

Application : sur la partie du corps atteinte. Appliquer le gel en aliquotes en employant des seringues calibrées (sans aiguilles).

Cette information se rapporte aux produits *DiffusiMAX*® seulement. L'emploi d'autres types d'OLP peut aboutir à un produit final inférieur. On ne prétend pas que ce produit est efficace ou sans aucun danger. Cette information est disponible uniquement à la demande non sollicitée de médecins et de pharmaciens. Ne pas reproduire sans permission.