

TABLEAU D4

Antiémétiques à base de *DiffusiMAX*[®]

Médicament	Solvant	Composant <i>DiffusiMAX</i>	Gamme de concentration (%)	Concentration typique (%)	Volume typique (mL)	Dose typique (mg)	Fréquence d'application
dexaméthasone	propylène-glycol	B	1 – 5	2	0,5	10	bid
dimenhydrinate	eau	B	2 – 5	5	1	50	q4 – 6h
métoclopramide	eau	B	1 – 5	1	1	10	q4 – 6h
scopolamine	eau	B	0,25 – 0,5	0,25	0,5	0,25	q8h

Composant *DiffusiMAX* = composant du système *DiffusiMAX* à utiliser pour solubiliser le médicament.

Eau = eau distillée

Application : pour administration systémique. Appliquer le gel en aliquotes en employant des seringues calibrées (sans aiguilles). Appliquer aux parties du corps où la peau est mince : derrière les oreilles, sur les clavicules ou au creux des poignets.

Cette information se rapporte aux produits *DiffusiMAX*[®] seulement. L'emploi d'autres types d'OLP peut aboutir à un produit final inférieur. On ne prétend pas que ce produit est efficace ou sans aucun danger. Cette information est disponible uniquement à la demande non sollicitée de médecins et de pharmaciens. Ne pas reproduire sans permission.