

TABLEAU D5

Analgésiques systémiques à base de *DiffusiMAX*®

Médicament	Solvant	Composant <i>DiffusiMAX</i>	Gamme de concentration (%)	Concentration typique (%)	Volume typique (mL)	Dose typique (mg)	Fréquence d'application
acétaminophène	propylène-glycol	B	5 – 10	6,5	10	650	q4 – 6h
hydromorphone	eau	B	0,1 – 2	1	0,5	5	q4 – 6h
sulfate de morphine	eau	B	0,1 – 2	1	2	20	q4 – 6h

Composant *DiffusiMAX* = composant du système *DiffusiMAX* à utiliser pour solubiliser le médicament.

Eau = eau distillée

Application : pour administration systémique. Appliquer le gel en aliquotes en employant des seringues calibrées (sans aiguilles). Appliquer aux parties du corps où la peau est mince : derrière les oreilles, sur les clavicules ou au creux des poignets. La gamme de doses des narcotiques peut beaucoup varier selon la tolérance des patients.

Cette information se rapporte aux produits *DiffusiMAX*® seulement. L'emploi d'autres types d'OLP peut aboutir à un produit final inférieur. On ne prétend pas que ce produit est efficace ou sans aucun danger. Cette information est disponible uniquement à la demande non sollicitée de médecins et de pharmaciens. Ne pas reproduire sans permission.