

## TABLEAU D6

### Hormones systémiques à base de *DiffusiMAX*®

Médicament	Solvant	Composant <i>DiffusiMAX</i>	Gamme de concentration (%)	Concentration typique (%)	Volume typique (mL)	Dose typique (mg)	Fréquence d'application
progestérone	propylène-glycol	B	1 – 10	3	2,5	75	qd
testostérone (femmes)	alcool	A	1 – 5	1	1	10	qd – bid
testostérone (hommes)	alcool	A	1 – 5	2	5	100	qd – bid

Composant *DiffusiMAX* = composant du système *DiffusiMAX* à utiliser pour solubiliser le médicament.

Alcool = alcool éthylique (95 %) ou alcool isopropylique (70 %)

**Application :** appliquer le gel en aliquotes en employant des seringues calibrées (sans aiguilles). Appliquer aux parties du corps où la peau est mince : derrière les oreilles, sur les clavicules ou au creux des poignets.

Cette information se rapporte aux produits *DiffusiMAX*® seulement. L'emploi d'autres types d'OLP peut aboutir à un produit final inférieur. On ne prétend pas que ce produit est efficace ou sans aucun danger. Cette information est disponible uniquement à la demande non sollicitée de médecins et de pharmaciens. Ne pas reproduire sans permission.